



SPEIKOPLAQUE / SPEIKOPLAQUE 3% / SPEIKOPLAQUE DUO

Flüssigkeiten zur Plaqueerkennung

Zusammensetzung:

SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3% enthalten Erythrosin (E 127), Demineralisiertes Wasser. SPEIKOPLAQUE DUO enthält Patentblau (E131), Phloxin B, Demineralisiertes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Indikatorflüssigkeiten zur Visualisierung von Zahnbelag (Plaque) auf Zahnoberflächen. Nach Aufbringen von SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3 % färbt sich der Belag mehr oder weniger rot, wobei SPEIKOPLAQUE 3 % intensiver färbt.

Nach Aufbringen von SPEIKOPLAQUE DUO färben sich ältere Beläge blau, jüngere Beläge rot.

Gegenanzeigen:

Allergie gegen Erythrosin, Jod und Sonnenlicht (Fotodermatose).
Hyperkinetisches Syndrom bei Kindern (nur bei SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3%)
Kinder unter sechs Jahren (nur bei SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3%)

Nebenwirkungen / Wechselwirkungen:

Keine bekannt

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Einige Tropfen der Indikatorflüssigkeit in ein Dappenglas geben. Mit dem Pinsel oder einem Wattepellet die Flüssigkeit aufnehmen und auf die zu prüfenden Zahnoberflächen aufbringen. Vorhandener Belag wird durch Rotfärbung (SPEIKOPLAQUE DUO auch blau) sofort sichtbar. Entfernung der Färbung durch Spülen mit Wasser und Putzen der Zähne.

Hinweise:

Das Medizinprodukt soll nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr angewendet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Handelsform:

Flüssigkeit SPEIKOPLAQUE	Inhalt: 20 ml	Bestell-Nr. 1052
Flüssigkeit SPEIKOPLAQUE 3 %	Inhalt: 20 ml	Bestell-Nr. 1075
Flüssigkeit SPEIKOPLAQUE DUO	Inhalt: 20 ml	Bestell-Nr. 1054

Stand der Information: Februar 2006

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH Postfach 7204 D-48039 Münster
Telefon 0251/789040 Telefax 0251/7890422 e-mail: info@speiko.de www.speiko.de



SPEIKOPLAQUE / SPEIKOPLAQUE 3 % / SPEIKOPLAQUE DUO

Staining liquid for the visualisation of dental plaques

Composition:

SPEIKOPLAQUE and SPEIKOPLAQUE 3 % contain erythrosin (E 127), purified water.
SPEIKOPLAQUE DUO contains Patent Blue dye (E 131), Phloxin B; purified water.

Applications:

Indicator liquid to visualise plaque on dental surfaces. Plaques assume a more or less red colour after application of SPEIKOPLAQUE or SPEIKOPLAQUE 3 %, whereas SPEIKOPLAQUE 3 % colours more intense.

After application of SPEIKOPLAQUE DUO assume older plaque blue colour, younger plaque red colour.

Contraindications:

Allergic reactions to erythrosin, iodine and sunlight (photodermatosis).
Hyperkinetic syndrome in children (SPEIKOPLAQUE and SPEIKOPLAQUE 3 %)
Children under six years of age (SPEIKOPLAQUE and SPEIKOPLAQUE 3 %)

Side-effects / interactions:

unknown

Dosage instructions, mode and duration of application:

Add several drops of the indicator liquid into a Dappen-dish. The liquid is applied to the dental surface with a brush or cotton swab. Already existent plaques become immediately visible by red (SPEIKOPLAQUE DUO also blue) colour. Removal of the stain is accomplished by rinsing with water or teeth-brushing.

Special instructions:

Do not use this medical product after its shelf-life has expired.
Keep out of the reach of children.

Available in the following packs:

liquid	SPEIKOPLAQUE	Contents: 20 ml	Art. No.: 1052
liquid	SPEIKOPLAQUE 3 %	Contents: 20 ml	Art. No.: 1075
liquid	SPEIKOPLAQUE DUO	Contents: 20 ml	Art. No.: 1054

Status: february 2006

SPEIKO®- Dr. Speier GmbH P.O.Box 7204 D-48039 Münster
Telephone ++49/251/789040 Telefax ++49/251/7890422 e-mail: info@speiko.de www.speiko.de

Printed in Germany Imprimé en Allemagne



SPEIKOPLAQUE SPEIKOPLAQUE 3% / SPEIKOPLAQUE DUO

Liquide pour la localisation de plaques

Composition :

Contient de l'érythrosine (E 127), de l'eau purifiée (SPEIKOPLAQUE et SPEIKOPLAQUE 3 %).
Contiens du Bleu Patenté (Bleu E 131), Phloxin B; de l'eau purifiée (SPEIKOPLAQUE DUO).

Indications thérapeutiques :

Liquide indicateur pour la visualisation de tartre (plaque) sur les surfaces des dents. Après application de SPEIKOPLAQUE et SPEIKOPLAQUE 3%, le tartre se colore plus ou moins rouge. SPEIKOPLAQUE 3% colore plus intense. Après application de SPEIKOPLAQUE DUO les tartres plus anciens se colorent en bleu, les plus récents en rouge.

Contre-indications :

Allergies à l'érythrosine, à l'iode et à la lumière du soleil (photodermatose).
Syndrome hypercinétique chez l'enfant (SPEIKOPLAQUE et SPEIKOPLAQUE 3%).
Enfants de moins de six ans (SPEIKOPLAQUE et SPEIKOPLAQUE 3%).

Effets secondaires / interactions :

Aucuns de connus.

Posologie, mode et durée d'administration :

Mettez quelques gouttes de liquide indicatrice dans un godet de Dappen. La liquide s'applique sur la surface de la dent au pinceau ou au tampon d'ouate. En présence de tartre: coloration rougeâtre immédiate (SPEIKOPLAQUE DUO aussi bleu). Enlèvement de la coloration par rinçage à l'eau et en brossant les dents.

Remarques importantes :

Ce produit médical ne doit plus être utilisé une fois que sa date limite d'utilisation est dépassée.
A éloigner de la portée d'enfants.

Présentation :

liquide SPEIKOPLAQUE	Contenu : 20 ml	Référence 1052
liquide SPEIKOPLAQUE 3 %	Contenu : 20 ml	Référence 1075
liquide SPEIKOPLAQUE DUO	Contenu : 20 ml	Référence 1054

Etat : février 2006

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH Postfach 7204 D-48039 Münster
Téléphone : ++49/251/7 89 040 Fax : ++ 49/251/78 90 422 E-mail : info@speiko.de
www.speiko.de

Imprimé en Allemagne - Printed in Germany